

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鼻炎用内服薬

持続性さとう鼻炎カプセル

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、頭が重い等は、鼻かぜやアレルギー性鼻炎による諸症状です。鼻炎は鼻の粘膜が腫れあがって、空気の通過を妨害しますので、気分がすぐれないばかりか睡眠不足、過労や注意力・集中力・根気力の低下等、日常生活を不快にします。

持続性さとう鼻炎カプセルは、これらの諸症状を緩和して、効き目をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。
緑内障
- (7)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の量を服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 カプセル	2 回 (朝夕)
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量

2カプセル (成人の1日量) 中

成 分	含 量	は た ら き
塩酸ブソイドエフェドリン	70mg	鼻粘膜の充血や腫れを抑え、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を鎮めます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	粘液の分泌を抑え、鼻水やなみだ目を改善します。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。
サイシン乾燥エキス (原生薬として)	30mg 300mg)	アレルギー症状を抑えます。

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、青色1号、ラウリル硫酸Na、ゼラチン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9：00～16：30 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2