

## 目薬

### 第2類医薬品

# アイガンビューティ

近年、花粉やハウスダスト（室内塵）、大気汚染などの原因となって起こる眼疾患が増えています。この中で「目のかゆみ」は最も多い症状です。かゆみは、まぶたのふちや目頭に強く現れ、つい不快感から手でこすり症状を悪化させることがあります。アイガンビューティはこのような「目のかゆみ」や「結膜充血」などにすぐれた効果をあらわします。また、紫外線による眼炎や眼病予防にもお使い頂けます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

### 【効能・効果】

目のかゆみ、結膜充血、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 【用法・用量】

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。容器の先が、まぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。
- (6) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (7) 点眼用のみ使用してください。



**【成分・分量】**


100mL中

| 成 分             | 分 量    |
|-----------------|--------|
| イブシロン-アミノカブロン酸  | 2000mg |
| グリチルリチン酸二カリウム   | 200mg  |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 30mg   |
| ナファゾリン塩酸塩       | 3mg    |

添加物として、ホウ酸、クエン酸水和物、パラベン、クロロブタノール、トメントール、d-ボルネオール、d-カンフル、エタノールを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお問い合わせ申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



**株式会社 廣 貫 堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)