

“肩こり・関節痛・眼精疲労の症状の緩和に”

メコプロミン プレミアム

第3類医薬品

(フルスルチアミン・メコパラミン製剤 葉酸配合)

特 徴

メコプロミン プレミアムは、神経・肉体系の働きに作用するビタミンB₁誘導体、神経の機能に関与するビタミンB₆、ビタミンB₁₂の一種であるメコパラミンを配合し、「つらい目の疲れ」「肩・首すじのこり」「腰の痛み」などの症状に優れた効果をあらわします。更に、本剤は、体のすみずみの血液循環を改善するビタミンE、神経細胞などの再生に関与する葉酸を配合した服用しやすい淡黄色の糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
軟便、下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
5. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

○次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法・用量

次の量を食後水又はお湯にて服用してください。

年 齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1 回 量	1 錠	服用しないこと
服用回数	1日3回	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(3錠中)

成分	分量	作用
メコバラミン(活性型ビタミンB12)	1.5mg	傷ついた末梢神経を正常な状態にして、腰痛や神経痛・手足のしびれを緩和します。
葉酸	5mg	メコバラミンとの相乗効果で、末梢神経の修復作用を高め、こりと痛みを取り除きます。
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (dl- α -トコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg (100mg)	血行を促進させ、肩こり・腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。
ニコチン酸アミド	60mg	
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体) (フルスルチアミンとして)	109.16mg (100mg)	神経細胞の機能を維持し神経を円滑に働かせ硬くなった筋肉をほぐし、肩こり・腰痛・目の疲れに効果をあらわします。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100mg	
パントテン酸カルシウム タイプS (パントテン酸カルシウムとして)	46.2mg (30mg)	脂質や糖質をエネルギーに変える際、生体内代謝に重要な役割をはたし、疲労の回復に役立ちます。
ガンマーオリザノール	10mg	神経や筋肉の機能維持に役立つビタミンB1・B6・B12の働きを助けます。

添加物として、乳酸カルシウム水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、ポビドン、リボフラビン、カルナウバロウを含む。

【成分・分量に関連する注意】

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください(本剤は光に対して不安定です)。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
4. ビンのフタの閉め方が不十分な場合、又は落下等により衝撃が加わったとき、錠剤が割れるおそれがありますので、服用のつど必ずフタはよく閉めてお取扱いにご注意ください(割れた錠剤はビンよりお出しください)。
5. 本剤は糖衣錠ですから水分が錠剤につくと表面の糖衣が一部溶けて変色又はむらを生ずることがありますので、ぬれた手で取扱わないようにしてください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
6. 配置期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお期限内であっても、一度開封した後は品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555

受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室へ

製造販売元



至誠堂製薬株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1