

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には必ずお読みください

第3類医薬品

おきゅ膏Z (鎮痛消炎薬)

おきゅ膏Zは、これを貼りますと配合成分が患部皮下組織に浸透し、一瞬しみとおるような感じがあって、患部の毛細血管を拡張して血液の循環を高め、筋肉その他の組織に快い温感を与えて、こりや痛みが軽快になります。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量


1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

注 意

紙と一緒にメクレないよう親指のハラで軽くなでるようにしてメクってください。



(裏面もお読みください。)

成分及び分量 膏体100g(0.70237m²)中

dl-カンフル	1.26g	l-メントール	3.16g
ハッカ油	0.79g	サリチル酸メチル	6.32g
グリチルレチン酸	0.148g	トコフェロール酢酸エステル	0.35g
ノニル酸ワニリルアミド	0.053g		


添加物としてポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、三酸化鉄、黄色三酸化鉄を含有します。

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ご使用にあたって

1. 下図を参考にし、貼る場所をきめて、患部を乾いたタオル等でよくふいてから貼ってください。
2. 動きの激しい部位に貼用の場合は、よく手のひらで全体を圧着してください。
3. 手足に貼用の場合は温感が少ないことがありますので適宜枚数を増やしてください。



■お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話：076-479-1313
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173